



DLP 12-8-875077 5  
**AVERTISSEMENTS AGRICOLES®**  
**REGION MIDI-PYRENEES**

**ÉDITION GRANDES CULTURES**

Ministère de l'Agriculture  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX  
Tél. 61. 24. 06. 51

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
Abonnement annuel 125 F.  
REGISSEUR DE RECETTES: D.R.A.F. "MIDI-PYRENEES"  
CCP : 8618-62 Y Toulouse

I.S.S.N. : 0752-2053

BULLETIN N° 8 DU 26 JUIN 1987

**TOURNESOL**

**PHOMOPSIS**

Aucun symptôme n'a encore été observé en cultures. Cependant, du fait des conditions climatiques favorables à la maladie, nous rappelons notre conseil de traitement dans les situations à risques (voir bulletin précédent).

**SCLEROTINIA**

Conséquences du temps frais et humide du mois de juin, des attaques de Sclerotinia se manifestent localement dans l'ensemble de la région. Le Lauragais semble, d'après les premières enquêtes, le secteur le plus touché par la maladie.

Les symptômes observés sont les suivants :

- pourriture du bout des feuilles entourant le capitule,
- feuilles du sommet plissées, en forme de coeurs (comme rongées au bout),
- pourriture du bouton floral et parfois même de la tige.

De nouvelles sorties de symptômes risquent de se produire au cours des prochains jours.

***Observer vos parcelles au plus vite.***

*S'il n'existe à l'heure actuelle aucune méthode de lutte valable sur des attaques se produisant à des stades tardifs du tournesol, par contre des traitements avant le début de la floraison peuvent limiter l'extension de la maladie.*

***Intervenir rapidement dans les parcelles attaquées tant qu'il est possible de passer avec le tracteur.***

***Utiliser l'un des produits suivants :***

- RONILAN	à	1,5 l/ha	} + 1 l d'huile
- SUMISCLEX	à	1 l/ha	
- BENLATE (*)	à	1 kg/ha	
- BAVISTINE	à	1 l/ha	

(\*) produit également efficace sur Phomopsis

Une amélioration des conditions climatiques serait le meilleur remède à la maladie en limitant l'incidence des attaques.

**PUCERONS**

Leur présence est observée dans quelques parcelles. Elle se manifeste par une crispation et une décoloration des feuilles.

***Aucune intervention ne se justifie contre ces ravageurs.***

P.1.13

M E L O N

CLADOSPORIOSE - ANTHRACNOSE - MILDIOU

Le temps pluvieux est favorable aux contaminations.

***Maintenir la protection avec l'un des produits suivants :***

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| - manèbe         | (nombreuses spécialités) |
| - mancozèbe      | (nombreuses spécialités) |
| - chlorothalonil | (DACONIL)                |